



HI-WETT

Univerzalno pomožno sredstvo za vse vrste FFS in foliarnih gnojil

UPORABA ZAGOTAVLJA:

- zmanjševanje zanašanja FFS (homogenizira velikost kapljic),
- povečanje zadrževanja nanešenih kapljic na poškropljeni površini (super retencija),
- super omočevanje,
- boljše lepljenje in vnos FFS v rastlino,
- močnejše pozicioniranje talnih herbicidov v tleh (boljša razporeditev v talnem profilu).

Doziranje (vinska trta): 0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha
 0,15 L/ha pri porabi vode do 250-500L/ha
 0,2 L/ha pri porabi vode do 250-500L/ha



Zatiranje plevelov

CERTIS BELCHIM nudi najbolj celovit izbor pripravkov brez glifosатов za zatiranje plevelov v vinski trti

CHIKARA - sulfonilsečninski herbicid s talnim in foliarnim delovanjem za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov.

UPORABA:

- **CHIKARA 120 - 200 g/ha** - Dolgotrajno talno delovanje za škropljenje ko pleveli še niso razviti. Višina odmerka bolj vpliva na dolžino kot na spekter delovanja. Priporočeno je škropljenje spomladi ali jeseni na tla brez plevelov. Chikara se uporablja v vinogradih starejših od štirih let.
- **CHIKARA 150-200 g/ha + BELOUKHA 16 L/ha** - Kombinacija s foliarnim in dolgotrajnim talnim delovanjem za škropljenje ko so pleveli že razviti.

FUSILADE MAX - foliarni herbicid za zatiranje ozkolistnih plevelov in trav v vinogradih (odmerek do 2 L/ha).

*Odmerki so za neto poškropljeno površino. Pri škropljenju v pasovih je odmerek ¼ do ⅓ navedene doze.



Foliarna prehrana

Foliarna prehrana z dušikom, borom in mikroelementi

AZO-SPEED: vsebuje hitri in dolgotrajno dostopni dušik, magnezij in žveplo.

- UPORABA: 5-10 L/ha 1-2X pred cvetenjem, 20 L/ha - optimizacija količine dušika v moštu - 2 aplikaciji v času mehčanja jagod, 5-10 L/ha - po trgatvi, pred začetkom odpadanja listov.
- Možno je mešanje s FFS.

BORACTIV: vsebuje bor, molibden, dušik, magnezij in žveplo.

- UPORABA: 2,5 L/ha (max. koncentracija 1,5%): (3 aplikacije pred cvetenjem, 1 aplikacija po cvetenju).
- Uporaba možna tudi v ekološki proizvodnji.
- Možno je mešanje s FFS.

VINSKA TRTA

Certis Belchim priporočila

Certis Belchim nudi celovito zaščito pred boleznimi in pleveli ter foliarna gnojila za optimizacijo oskrbe z dušikom, borom in mikroelementi.



Certis Belchim **VINEPRO**™
 TECHNOLOGY

Celovita zaščita, ki zagotavlja optimalno kvaliteto in ekonomiko

CERTIS BELCHIM STROKOVNA PODPORA:

Mitja Törnár: 031 239 720 - mitja.tornar@certisbelchim.com
 Mitja Brežnik: 051 354 767 - mitja.breznik@certisbelchim.com
 Urban Simončič: 031 459 500 - urban.simoncic@certisbelchim.com
 Anton Gošnik: 051 262 209 - anton.gosnik@certisbelchim.com
 Vasja Hafner: 091 416 6555 - vasja.hafner@certisbelchim.com



Peronospora vinske trte



Lokosistemski fungicid s preventivnim, kurativnim, eridikativnim in kontaktnim delovanjem proti peronospori vinske trte. Unikatno ACTIN POWER stimulatивно delovanje na genetski mehanizem rastline.

Aktivna snov: valifenalat 6%, folpet 48%
Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Število dovoljenih tretiranj: 2X
Odmerek: do 2 kg/ha
Karenca: 28 dni
Pakiranje: 200 g, 1 kg, 5 kg



Robustna kombinacija s sistemskim in kontaktnim delovanjem na peronosporo.

Aktivna snov: cimoksamil 4%, folpet 33,4%
Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Število dovoljenih tretiranj: 1X
Odmerek: do 3 kg/ha
Karenca: 28 dni
Pakiranje: 250 g, 1 kg, 5 kg



Edinstvena formulacija dveh aktivnih snovi v sodobni tekoči formulaciji za zatiranje peronospore vinske trte. Deluje preventivno, kontaktno in antisporelno (kurativa do 24 ur) in ima močno izraženo stransko delovanje na črno pegavost, sivo plesen, črno grozdno gnilobo...

Aktivna snov: ciazofamid 40 g/L, folpet 400 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Število dovoljenih tretiranj: 6X
Odmerek: 2,5 L/ha
Karenca: 28 dni
Pakiranje: 500 ml, 1 L, 5 L



Preventivni sistemsko kontaktni fungicid za zatiranje peronospore vinske trte. Odličen izbor za zaključna škropljenja vinske trte (kratka karenca in brez vplivov na enološke procese).

Aktivna snov: ciazofamid 2,5%, dinatrijev fosfanat 25%
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Število dovoljenih tretiranj: 2X
Odmerek: do 4 L/ha
Karenca: 21 dni
Pakiranje: 1 L, 10 L



Obvezen partner fungicidom v primerih, ko je potrebno sestaviti najmočnejše možno sistemsko-kurativno delovanje proti peronospori vinske trte (v kritičnih fenofazah trte in ob pojavih bolezni).

Aktivna snov: cimoksamil 45%,
Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Število dovoljenih tretiranj: 7X
Odmerek: od 0,125 do 0,25 kg/ha (glede na fenofazo)
Karenca: 7 dni
Pakiranje: 1 kg



Kontaktne preventivni fungicid za zatiranje peronospore na osnovi bakra, ki ima najvišjo stopnjo biološke razgradljivosti na trgu.

Aktivna snov: bakrov hidroksid 53,8 %
Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Število dovoljenih tretiranj: 3X
Odmerek: 2 kg/ha
Karenca: 21 dni
Pakiranje: 5 kg



Izrazito sistemski fungicid za zatiranje oidija vinske trte z močno izraženim delovanjem na sivo plesen. Zanj je značilno tudi močno parno delovanje - premeščanje v območja kjer aplikacija ni idealna.

Aktivna snov: piriufenon 300 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Število dovoljenih tretiranj: 3X
Odmerek: 0,15 - 0,3 L/ha (glede na fenofazo)
Karenca: 28 dni
Pakiranje: 0,1 L, 1 L



Fungicid s izrazitim sistemskim in kurativnim delovanjem na oidij vinske trte.

Aktivna snov: difenokonazol 250 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Število dovoljenih tretiranj: 2X
Odmerek: 0,12 L/ha
Karenca: 21 dni
Pakiranje: 0,1 L, 1 L



Učinkovita popolnoma nova aktivna snov deluje sistemsko na vse razvojne stadije sive plesni (uporablja se v glavnem preventivno, deluje pa tudi kurativno - do 36 ur). Zenby ima odlično delovanje tudi na oidij vinske trte. Kadar se škropi z ZENBY-jem ni potrebno dodajati specifičnih fungicidov proti oidiju. Priporoča se le dodajanje žvepla.

Aktivna snov: izofetamid 400 g/L
Formulacija: koncentrirana suspenzija (SC)
Število dovoljenih tretiranj: 1-2 X
Odmerek: 0,8 - 1 L/ha (v cono grozdja)
Karenca: 21 dni
Pakiranje: 0,2 L, 1 L



- Sredstva za varstvo rastlin uporabljajte varno, pred uporabo vselej preberite navodilo za uporabo in informacije o sredstvu.
- Priporočilo je orientacijske narave.
- Za podrobnejša navodila kontaktirajte našo strokovno službo.

Pepelasta plesen -oidij



Siva plesen -botritis



Priporočen program škropljenja

Peronospora vinske trte



2 kg/ha



2 L/ha



do 3 kg/ha



2 kg/ha



3 L/ha

0,20 kg/ha



2 kg/ha



2,5 L/ha

0,20 kg/ha



4 L/ha




2 kg/ha

Oidij



0,12 L/ha



0,25 - 0,3 L/ha



0,12 L/ha



0,25 - 0,3 L/ha



0,25 - 0,3 L/ha

Siva plesen (gniloba)



0,8 - 1 L/ha v cono grozdov



0,8 - 1 L/ha v cono grozdov



BBCH 07



BBCH 12



BBCH 13



BBCH 19



BBCH 53



BBCH 57



BBCH 69



BBCH 71



BBCH 73



BBCH 75



BBCH 79



BBCH 81



BBCH 89